



OFERTA NA
Nowy
SEZON

Ochrona biologiczna

- ① **Steinernema feltiae**
(niciansie, zwalczanie ziemiórki)
- ② **Heterorhabditis bacteriophora**
(niciansie, zwalczanie opuchlaki, pędraki)
- ③ **Steinernema carpocapsae**
(niciansie, zwalczanie gąsienice, larwy chrząszczy, turkuć podjadek)

Uwagi:

Zamówienia są realizowane w ciągu 5 dni roboczych (termin składania zamówienia do czwartku).

Zapewniamy systematyczne dostawy do wyznaczonego miejsca.

Koszt dostawy uzależniony jest od ilości zamówionych produktów.

Dowiedz się więcej



42 712 51 00 | 512 331 167 | 504 109 196



solfum@solfum.com.pl



www.solfum.com.pl



Heterorhabditis Bacteriophora

Heterorhabditis bacteriophora jest nicieniem będącym pasożytem larw owadów różnych szkodników glebowych (m.in. opuchlaków, pędraków). Służy do biologicznego zwalczania larw chrząszczy-ryjkowców m.in. opuchlaka truskawkowca, larw guniaka czerwczyka, ogrodnicy niszczytelki, młodych larw chrząszcza majowego, larw pchełek ziemnych, larw motyla-jerzyka pospolitego. Opuchlaki zwalczamy w 2-ch aplikacjach: kwiecień/maj i sierpień/wrzesień, dzięki czemu niszczymy wszystkie stadia larwalne. Pędraki – aplikacja latem lipiec/sierpień (zwalczamy tylko tegoroczne larwy).

Cykl rozwojowy i działanie

Nicienie Heterorhabditis bacteriophora aktywnie szukają larw szkodników. Larwy nicienia mają około 1,0 do 1,5 mm długości w trzecim stadium rozwojowym i dzięki czemu z łatwością wnikają w ciało żywiciela. Pozostałe stadia nicienia będą rozwijać się wewnątrz gospodarza. Wytwarzają bakterie, które ułatwiają im żywienie się zawartością larw szkodnika. Zainfekowane larwy są różowe, czerwone i brązowe. Po zaatakowaniu szkodnik umiera w ciągu godzin lub dni.

Opakowanie

Heterorhabditis bacteriophora to produkt w postaci pu-dełka, zawierający 50 lub 500 milionów pożytecznych larw (w trzecim stadium rozwojowym) zmieszanych z materiałem nośnym.

Przechowywanie

Maksymalny czas przechowywania produktu to 10-12 tygodni, bez dostępu światła, w temperaturze od 2°C do 6°C. Opakowania przechowywać w pozycji poziomej.

Uwagi: Promieniowanie UV jest szkodliwe dla nicieni i dlatego też zabieg należy wykonać wieczorem.

Dawkowanie

Zawartość opak. rozpuścić w 5 l wody (15-20°C), a następnie mocno wymieszać i odczekać 5 min. aż produkt nasiąknie. Ponownie wymieszać i po ok. 30 s mieszaninę zlać do drugiego naczynia w celu oddzielenia nośnika, a następnie uzupełnić odpowiednią ilością wody. Wykonać zabieg zaraz po przygotowaniu preparatu. Można używać konewki, systemów nawadniających, lub przy użyciu opryskiwacza, z którego zostały wyjęte filtry. Podczas zabiegu konieczne jest ciągłe mieszanie preparatu, aby nicienie nie opadły na dno. Otwarte opakowanie zużyć w całości, podobnie jak przygotowany roztwór.

	dawka (szt./m ²)	odstęp (dni)	liczba introdukcji	uwagi
zapobiegawczo	—	—	—	—
małe nasilenie	500 000 szt./m ²	75-100 dni	1 x	opak. 50 mln: 100 m ² opak. 500 mln: 1000 m ²
duże nasilenie	1 000 000 szt./m ²	50-75 dni	2 x	opak. 50 mln: 50 m ² opak. 500 mln: 500 m ²



PUPH SOLFUM Sp. z o.o.

ul. Ziemiańska 21 | 95-070 Rąbień AB k/Łodzi

tel. 42 712 51 00 | tel. kom. 512 331 167 | 504 109 196 | e-mail: solfum@solfum.com.pl | www: www.solfum.com.pl

